

LOTE:

Bioestimulante de plantas no microbiano.

Botan Estrés, polifenoles naturales.

Líquido en solución · Concentrado soluble.

Composición antioxidante de aplicación foliar y vía riego, para disminuir el estrés oxidativo y favorecer la fotosíntesis.

COMPOSICIÓN:

Extracto vegetal	10% p/v
Carbono orgánico	1,9% p/v
Polifenoles	0,2% p/v
Ácido Ascórbico	0,07% p/v
Ácido Cítrico	0,09% p/v

Contaminantes:

Cd · As · Pb · Hg < 1 ppm

Cap. Antiox. (DPPH) 4 gTrolox/L

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS:

Densidad (a 20 °C)	1 g/L
pH (a 20 °C)	3,3

Bioestimulante autorizado por el SAG para su uso en agricultura orgánica.

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Fabricado y formulado por:

BOTANITEC SPA

Las Rocas 181, Santo Domingo, Reg. de Valparaíso, Chile.

CONTENIDO NETO 1 L

Sustancia no peligrosa

Cultivo	Aplicación	Número de aplicaciones	Tipo	Dosis
Pasto y plantas ornamentales	Tratamiento preventivo: Previo a un evento de estrés ¹ , cada 7 días.	Desde 3	Foliar	6 cc/L
	Tratamiento curativo: Después del evento de estrés ¹ y repetir cada 14 días.	1 a 4	Foliar	6 cc/L
Hortalizas	Tratamiento preventivo: Previo a un evento de estrés ¹ , cada 7 días.	Desde 3	Foliar	6 cc/L
	Tratamiento curativo: Después del evento de estrés ¹ y repetir cada 14 días.	1 a 4	Foliar	6 cc/L
Huertos frutales	Tratamiento preventivo: Previo a un evento de estrés ¹ , cada 7 días.	Desde 3	Foliar	3 L/ha
	Tratamiento curativo: Después del evento de estrés ¹ y repetir cada 14 días.	1 a 4	Foliar	6 L/ha
	Durante evento de estrés radical ² , con crecimiento activo de raíces.	1 a 2	Riego	6 L/ha
Huertos frutales en formación	Tratamiento preventivo: Previo a un evento de estrés ¹ , cada 7 días.	Desde 3	Foliar	6 cc/L
	Tratamiento curativo: Después del evento de estrés ¹ y repetir cada 14 días.	1 a 4	Foliar	6 cc/L

1 Temperaturas extremas, alta radiación, estrés hídrico, salinidad e intoxicación por herbicida.

2 Suelo compactado, anegamiento y salinidad.

INDICACIONES DE USO: APLICACIÓN FOLIAR: Garantizar mojamiento suficiente para asegurar el cubrimiento uniforme de la planta. Utilizar preferentemente con turbopulverizador para garantizar la uniformidad de distribución. Evitar las siguientes condiciones: rocío presente, lluvia durante al menos las 24 horas anteriores y posteriores a la aplicación, con viento fuerte (> 11 Km/h) por el riesgo de deriva y/o temperaturas extremas. APLICACIÓN VÍA RIEGO: Sin riego automatizado: aplicar después del riego cubriendo la zona de raíces. Con riego automatizado: Aplicar en el segundo tercio del riego si no se hace lavado de tuberías; y en el tercer tercio del riego si se hace lavado de tuberías. Agitar el envase antes de usar.

COMPATIBILIDAD: Compatible con fertilizantes de uso común, *Trichoderma spp* y *Bacillus spp*. **ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y oscuro. No exponer a la luz solar directa. El producto puede acumular presión en el envase por lo que se recomienda abrir con cuidado. **CARACTERÍSTICAS:** No inflamable · No tóxico · No corrosivo · Producto biodegradable.



Producto apto para su uso en Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento NOP Controlado por ECOCERT

Consultas a (+56) 9 9548 9080 · info@botanitec.cl

www.botanitec.cl

