

Cultivo	Parámetro objetivo	Momento de aplicación	Nº de aplicaciones	Dosis	Mejoramiento sugerido (L/ha)
Césped y plantas ornamentales	Calidad y crecimiento	Cada 7 o 14 días	Desde 4	3 cc/L	-----
	Establecimiento	Primera aplicación 10 días después de siembra o trasplante, cada 7 a 14 días	4		
Cerezo	Calibre	Desde inicio de cuaja, cada 7 a 10 días.	4	3 L/ha	1.000 a 2.000
	Firmeza de fruto y pardeamiento	Desde fruto cuajado, cada 7 a 10 días.	4		
Uva de mesa y vid vinífera	Peso racimo y calidad	Desde floración, cada 14 días.	2	6 L/ha	500
	Calidad de escobajo	Desde fruto recién cuajado, cada 14 días.	2		
Arándanos y berries	Firmeza	Desde fruto recién cuajado, cada 7 días.	4	3 L/ha	500 a 1.000
	Calibre y color	Desde estado T de fruto (fruto de 40 mm), cada 7 a 14 días.	4		1.000
Manzano	Calibre y color	Desde estado T de fruto (fruto de 40 mm), cada 7 a 14 días.	4	3 L/ha	1.000
Nogal	Calibre y color	Desde cuaja, cada 7 días.	4	3 a 6 L/ha	2.000
Almendro	Cuaja y calibre	Desde inicio floración.	4	3 L/ha	1.000
Cítricos	Calibre y firmeza	Desde cuaja, cada 14 días.	2	6 L/ha	1.000 a 3.000
Huertos frutales en formación	Establecimiento	Desde trasplante, cada 7 a 10 días.	4	3 L/ha	1.000
		Brotación, cada 7 a 10 días.			
Hortalizas	Establecimiento y rendimiento	Desde 7 a 10 días después de trasplante, cada 7 a 14 días.	4	3 L/ha	500
Viveros	Crecimiento vegetativo	Desde 7 a 10 días después de trasplante, cada 7 a 14	4 a 6	300 a 600 Cc/ 100 L	-----