



Cultivo	Aplicación	N° de aplicaciones	Tipo de aplicación	Dosis
 Pasto y plantas ornamentales	Tratamiento preventivo: Previo a un evento de estrés ¹ , cada 7 días.	Desde 3	Foliar	6 cc/L
	Tratamiento curativo: Después del evento de estrés ¹ y repetir cada 14 días.	1 a 4		
 Hortalizas	Tratamiento preventivo: Previo a un evento de estrés ¹ , cada 7 días.	Desde 3	Foliar	6 cc/L
	Tratamiento curativo: Después del evento de estrés ¹ y repetir cada 14 días.	1 a 4		
 Huertos frutales	Tratamiento preventivo: Previo a un evento de estrés ¹ , cada 7 días.	Desde 3	Foliar	3 L/ha
	Tratamiento curativo: Después del evento de estrés ¹ y repetir cada 14 días.	1 a 4		6 L/ha
	Durante evento de estrés radical² , con crecimiento activo de raíces.	1 a 2	Riego	
 Huertos frutales en formación	Tratamiento preventivo: Previo a un evento de estrés ¹ , cada 7 días.	Desde 3	Foliar	6 cc/L
	Tratamiento curativo: Después del evento de estrés ¹ y repetir cada 14 días.	1 a 4		